



van den borne aardappelen

Rasbeschrijving Consumptie

ZORBA

CIP312/35 x Carola



Eigenschappen

Rijptijd	Vroeg
Opbrengst	Goed tot hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Lang
Knolaantal	10-13
Vleeskleur na koken	Lichtgeel
Schilkleur	Geel
Besvorming	Weinig
Kiemrust	Gemiddeld
Opkomst	Goed
Loofontwikkeling	Snel
Onderwatergewicht	410


Resistenties

Aardappelmoehheid	Vatbaar
Wratziekte	Vatbaar
Kringerigheid	Matig resistent
Phytophthora loof	Vrij resistent
Phytophthora knol	Weinig resistent
Schurft	Vrij resistent
Poederschurft	Vrij resistent
YN-virus	Resistent
Yntn-virus tolerantie	Tolerant

Teeltadvies

Bodem : geschikt voor alle grondsoorten, kans op lagere opbrengst op klei.

Plantafstand voor fritesaardappelen :

 afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg
uitgaande van een rijafstand van 75 cm

35/50

50/60 (gesneden)

34-38 cm

30-34 cm

Bemesting :

- Stikstof: Zorba heeft een ruime N-behoefte (vergelijkbaar met Bintje). 2/3 van de totale gift voor het poten toepassen, 1/3 na de knolzetting.
- Fosfaat en Kal: volgens advies bodemonderzoek.
- Vanaf opkomst enige malen een Borium bladmeststof toepassen. Regelmatig bladbemesting toevoegen i.v.m. gevoeligheid voor magnesium- en mangaangebrek.

Bewaring : Afland aflevering (korte bewaring mogelijk).

Kiemremming : Niet van toepassing.

Voorzorgsmaatregelen : Weinig gevoelig voor Sencor, gevoelig voor droogte, weinig gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw.

Andere opmerkingen : Bovenkant poters ca. 2cm onder maaiveld en grote ruggen vormen, om groene knollen te voorkomen. Bij lichte gronden, aanbeveling granulaat ter bestrijding van vreterij en vrijlevende aaltjes.